

※2013年3月改訂（記載要領一部改正に伴う改訂）
※2013年1月改訂（住所変更に伴う改訂）
2012年8月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬 玄武峰寿丸

〔販売名〕峰寿丸

⚠【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
次の人は服用しないで下さい。

- （1）胃腸の弱い人。
- （2）下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - （4）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

※2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】本品1日量(21丸)中

「日局」ジ オ ウ……	896mg	「日局」ブクリョウ……	336mg
「日局」サンシュユ……	448mg	「日局」ボ タ ン ピ……	336mg
「日局」サ ャ ク……	448mg	「日局」ケ イ ヒ……	112mg
「日局」タ ク シ ャ……	336mg	「日局」ブ シ 末……	112mg

なお、添加物として寒梅粉、コムギ、コメ、ハチミツ、白色セラックを含みます。

【効能・効果】 体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。
（食間とは、食後2～3時間を指します。）

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	7 丸	3 回
15歳未満	服用しないで下さい	

※用法・用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
 - （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - （3）他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
 - （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
 - （5）本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。
 - （6）本剤は蜂蜜を用いて丸剤としていますので、丸剤どうしがくっつくことがありますが、効果に変わりはありません。
- なお、くっついた場合には、容器の下を軽くたたいていただければ離れます。

※【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号
電 話：03（3807）3780
受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

販 売 元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



※発 売 元 伸 和 製 薬 株 式 会 社
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地