

\*：2009年4月に改訂しました。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

ほう い おう ぎ とう

漢方製剤

防已黄耆湯エキス錠 〔大峰〕

- 足などのむくみやハリの改善をします。つらい足のむくみ、立ち仕事で足がパンパンに張るなどの症状に…… 体内の水はけを良くして、余分な水分を調整する作用があります。（特にふくらはぎや膝関節などの下肢の水分代謝を改善します。）

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |


まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状                            |
|-------|--------------------------------|
| 間質性肺炎 | せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。      |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。 |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

### \*〔効 能〕

体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの次の諸症：肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、多汗症、肥満症（筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり）



（裏面もお読みください）

## 【用法用量】

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

| 年 齢        | 1 回 量   | 1 日服用回数 |
|------------|---------|---------|
| 成人（15 歳以上） | 4 錠     | 3 回     |
| 15歳未満 7歳以上 | 3 錠     |         |
| 7歳未満 5歳以上  | 2 錠     |         |
| 5歳未満       | 服用しないこと |         |

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成 分】

防已黄耆湯エキス錠〔大峰〕の1日量（12錠）中には下記生薬より得た防已黄耆湯エキス1,300mgを含む。

|        |      |        |       |
|--------|------|--------|-------|
| ボウイ    | 2.5g | タイソウ   | 1.5g  |
| オウギ    | 2.5g | カンゾウ   | 0.75g |
| ビャクジュツ | 1.5g | ショウキョウ | 0.5g  |

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

**サラヤ株式会社**  
大阪市東住吉区湯里2-2-8  
**☎0120-40-3636**

発売元 **サラヤ株式会社**  
〒546-0013  
大阪市東住吉区湯里2-2-8

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**  
〒635-0051  
奈良県大和高田市根成柿574

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
**☎0120-149-931**