

*：2009年4月に改訂しました。

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

ぼう ふう つう しょう さん

漢方製剤

防風通聖散工キス錠〔大峰〕

- 高血圧や肥満に伴う自覚症状（どうき、肩こり、のぼせ、むくみ、便秘）をとりながら脂肪太りを改善します。
- 便秘がちで皮下脂肪の多い方の肥満を改善します。
- 栄養の取り過ぎや運動不足等は肥満の大きな原因の一つです。特に中高年以降の皮下脂肪の蓄積は万病の原因になる恐れがあります。生活習慣病の予防と治療には不要な皮下脂肪の除去に努力する必要があります。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

（裏面もお読みください）

*【効 能】

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：
 高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・
 のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症
 (副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、
 ふきでもの(にきび)、肥満症



*【用法・用量】

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	4 錠	3 回
15歳未満7歳以上	3 錠	
7歳未満5歳以上	2 錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成 分】

防風通聖散エキス錠(大峰)の1日量(12錠)中には下記生薬より得た防風通聖散エキス粉末2,750mgを含む。

トウキ	0.6g	ショウキョウ	0.2g	バクジュツ	1.0g
シャクヤク	0.6g	ケイガイ	0.6g	キキョウ	1.0g
センキュウ	0.6g	ポウフウ	0.6g	オウゴン	1.0g
サンシシ	0.6g	マオウ	0.6g	カンゾウ	1.0g
レンギョウ	0.6g	ダイオウ	0.75g	セッコウ	1.0g
ハッカ	0.6g	乾燥硫酸ナトリウム	0.375g	カッセキ	1.5g

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、二酸化ケイ素を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

サラヤ株式会社
 大阪市東住吉区湯里2-2-8
☎0120-40-3636

発売元 **サラヤ株式会社**
 〒546-0013
 大阪市東住吉区湯里2-2-8

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
 〒635-0051
 奈良県大和高田市根成柿574

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931