

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

シ^{とう}ワ^きの^{けん}当^{ちゅう}帰^{とう}建中湯エキス顆粒



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヵ月位（下腹部痛、痔、脱肛の痛みに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合。

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

【成分・分量】

本品1日量4.5g又は3包(1包1.5g)中
「日局」ト ウ キ……2.0g 「日局」タ イ ソ ウ……2.0g
「日局」ケ イ ヒ……2.0g 「日局」シャクヤク……2.5g
「日局」ショウキョウ……0.5g 「日局」カ ン ゾ ウ……1.0g
上記生薬より得た当帰建中湯エキス粉末2800mgを含みます。
なお、添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素を含みます。

【効能・効果】

疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症：

月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み

【用法・用量】

次の量を食前又は食間^{（食間とは、食後2～3時間を指します。）}に水又は白湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回 量		1日服用回数
	300gボトル	分 包	
成人（15歳以上）	1.5g	1包	3回
15歳未満 7歳以上	2/3量	2/3包	
7歳未満 4歳以上	1/2量	1/2包	
4歳未満	服用しないで下さい		

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
（300gボトル包装の場合は、密栓して保管して下さい。）
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出る場合がありますが、効果にはかわりありませんので安心して服用して下さい。
- 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。

【お問い合わせ先】

伸和製薬株式会社 情報管理室
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地 1
電 話：03（3639）9771
受付時間：9時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

協和発酵グループ
発 売 元 伸 和 製 薬 株 式 会 社
東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目29番地 1
製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地

