

第2類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

漢方薬

シンワの当帰建中湯エキス顆粒



【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1 ヲ月位（下腹部痛、痔、脱肛の痛みに服用する場合には1 週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】 本品 1 日量4.5 g 中

「日局」ト ウ キ……2.0 g 「日局」タ イ ソ ウ……2.0 g
「日局」ケ イ ヒ……2.0 g 「日局」シャクヤク……2.5 g
「日局」ショウキョウ……0.5 g 「日局」カン ゾ ウ……1.0 g

上記生薬より得た当帰建中湯エキス粉末2800mgを含みます。

なお、添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、二酸化ケイ素を含みます。

【効能・効果】 体力虚弱で、疲労しやすく血色のすぐれないものの次の諸症： 月経痛、月経困難症、月経不順、腹痛、下腹部痛、腰痛、痔、 脱肛の痛み、病後・術後の体力低下

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。 （食間とは、食後 2 ～ 3 時間を指します。）

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1.5 g	3 回
15歳未満 7 歳以上	2/3量	
7 歳未満 4 歳以上	1/2量	
4 歳未満	服用しないで下さい	

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るがありますが、効果には変わりありませんので安心して服用して下さい。

*【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室

〒116-0003 東京都荒川区南千住 5 丁目17番 8 号

電 話：03（3807）3780

受付時間：9 時から17時まで（土・日曜、祝日を除く）

＊ 発 売 元 伸 和 製 薬 株 式 会 社

東京都荒川区南千住 5 丁目17番 8 号

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574番地