

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方薬

 けいがいれんぎょうとう
大峰荊芥連翹湯錠

⚠使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

《効能又は効果》

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：

蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

《用法及び用量》

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成 人（15歳以上）	4 錠	3 回
15歳未満 7 歳以上	3 錠	
7 歳未満 5 歳以上	2 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

（裏面もお読みください）

《成分及び分量》

大峰荊芥連翹湯錠の1日量（12錠）中には下記生薬より得た荊芥連翹湯エキス2400mgを含む。

トウキ	0.75 g	ケイガイ	0.75 g
シャクヤク	0.75 g	ボウフウ	0.75 g
センキュウ	0.75 g	ハッカ	0.75 g
ジオウ	0.75 g	キジツ	0.75 g
オウレン	0.75 g	カンゾウ	0.75 g
オウゴン	0.75 g	ビャクシ	1.25 g
オウバク	0.75 g	キキョウ	1.25 g
サンシシ	0.75 g	サイコ	1.25 g
レンギョウ	0.75 g		

添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、二酸化ケイ素、セルロースを含有する。

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

大峰堂薬品工業株式会社 「消費者相談窓口」

〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

電話 (0745) 22 - 3601(代)

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**

奈良県大和高田市根成柿574