

シオノギ®**葛根湯**エキス顆粒



使用上の注意 ……

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
- (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸の弱い人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどをおこしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
 - むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
 - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

…… 効能・効果 ……

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

…… 用法・用量 ……

次の量を1日3回食前または食間に、水またはぬるま湯でおのみください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	1 包	3 回
7 才以上 15 才未満	2/3 包	
4 才以上 7 才未満	1/2 包	
2 才以上 4 才未満	1/3 包	
2 才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

…… 成分・分量 ……


シオノギ葛根湯エキス顆粒は、淡褐色～褐色の分包顆粒剤で、3包（2.0g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成 分			含量（3包中）
葛根湯エキス（3/4量）	カッコン…………… 3.0g マオウ…………… 6.0g タイソウ…………… 3.0g ケイヒ…………… 2.25g	シャクヤク…………… 2.25g カンゾウ…………… 1.5g ショウキョウ…………… 0.75g より得たエキス	3600mg

添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、乳糖水和物、含水二酸化ケイ素を含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
シオノギヘルスケア株式会社「**医薬情報センター**」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成布574