

第2類医薬品

八味地黄丸料錠OM

開封口

漢方薬

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと。

(1) 胃腸の弱い人。(2) 下痢しやすい人。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。

(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位 症 状

皮膚 発疹・発赤、かゆみ

消化器 食欲不振、胃部不快感、腹痛

その他 動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

お問い合わせ先

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和郡高田市槻成林574

消費者相談窓口 電話 0746-22-3601

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



御座います

台帳管理

AS-2

第2類医薬品

八味地黄丸料錠OM

【成分及び分量】 1日量(9錠)中

ジオウ 2.5g ブクリョウ 1.5g

サンシュユ 1.5g ボタンビ 1.5g

サンヤク 1.5g ケイヒ 0.5g

タクシャ 1.5g ブシ末 0.5g

上記生薬より得た八味地黄丸エキス(1/2量)

2200mgを含む。

添加物として、CMC-Ca、二酸化ケイ素、クロス

CMC-Na、タルク、ステアリン酸Mg、セルロー

ス、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロ

ウを含む。

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい

所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用

の原因になります)品質が変わります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでくだ

さい。

漢方薬

第2類医薬品

八味地黄丸料錠OM

【効能又は効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が

冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに

口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、

かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、

むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩

こり、頭痛、耳鳴り)、軽い尿漏れ

【用法及び用量】

次の量を1日3回食前又は食間に、水又は

白湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3錠	3回
15歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の

指導監督のもとに服用させてください。

八味地黄丸料

エキス剤 270錠

大峰堂薬品工業株式会社

C220