

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の
肥満症・便秘・むくみ

エバユースリムF[®]

漢方製剤

〔エバユースリムFの特徴〕

本剤は、漢方書「宣明論」に記載されている代表的な漢方処方の一つである「防風通聖散」を服用しやすい錠剤にしたものです

1. 腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の肥満症・便秘・むくみおよび
高血圧に伴う症状（どろき、肩こり、のぼせ）に効果をあらわします
2. 漢方薬独特のにおい、苦味を抑えたフィルムコート錠です



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて
ください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師
にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに
医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があら われる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等 があらわれる
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが 重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛 等があらわれる

- (2) 1か月位（便秘に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなり
ない場合
3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師にご相談ください
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または
増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談
ください 下痢

【効能】

腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの次の諸症：肥満症，便秘，むくみ，
高血圧の随伴症状（どうき，肩こり，のぼせ）

【用法・用量】

次の量を，水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	4錠	3回 (食前または食間)
15歳未満	服用しないこと	

- (1) 用法・用量を厳守してください
- (2) 食間とは食事と次の食事の間をいいます（たとえば朝食と昼食のあいだの時間）

【成分・分量】

本剤は，淡赤紫色のフィルムコート錠で，12錠中に次の成分を含有する

防風通聖散エキス粉末 2750mg

原生薬として

トウキ..... 0.6g	マオウ..... 0.6g
シャクヤク..... 0.6g	ダイオウ..... 0.75g
センキュウ..... 0.6g	乾燥硫酸ナトリウム..... 0.375g
サンシシ..... 0.6g	ビャクジュツ..... 1g
レンギョウ..... 0.6g	キキョウ..... 1g
ハッカ..... 0.6g	オウゴン..... 1g
ショウキョウ..... 0.2g	カンゾウ..... 1g
ケイガイ..... 0.6g	セッコウ..... 1g
ボウフウ..... 0.6g	カッセキ..... 1.5g

添加物：ステアリン酸Mg，CMC-Ca，水酸化Al/Mg，メタケイ酸アルミン酸Mg，セルロース，ヒプロメロース，マクロゴール，カルナウバロウ，酸化チタン，赤色3号

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり，品質が変わる）
- (4) 水分が錠剤につくと表面が変色したり斑点が生じることがありますぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください
- (5) 容器内の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用ですので，開封後は捨ててください
- (6) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは，お買い求めの薬局・薬店，または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町 1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9：00～17：00（土，日，祝日を除く）

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574