

開封口

鼻炎用
点鼻薬

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【用法・用量】

成人(15才以上)及び7才以上の小児: 1日6回を限度とし、3時間以上の間隔をおいて、1回に1~2度ずつ鼻腔内に噴霧してください。
7才未満は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にとのみ使用してください。

(使用方法)

1. キャップをはずします。

2. 初めてご使用の際は、液が噴霧するまではねを数回、空押ししてください。



3. 右図のように容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。

4. 静かに息を吸い込みながら、はねを下まで押し、1回に1~2度ずつ噴霧してください。
できるだけ垂直に近い角度でお使いください。

5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでノズルを拭き、キャップをして保管してください。

〔液が残っている音はするが出ない時〕

液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。
緩やかなカーブがついているので容器を傾けずに噴霧すると、無駄なくお使いいただけます。



ノズルの先端はすでに小さな穴があいておりますので、針などで突くのはおやめください。

第2類医薬品

販売名: コネクタス点鼻薬

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: 鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

【成分・分量】(100mL中)

ナファゾリン塩酸塩……………50mg
クロルフェニルミンマレイン酸塩…500mg
リドカイン……………300mg
ベンゼトニウム塩化物……………20mg
添加剤: pH調節剤、等張化剤

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

製造番号

使用期限

奥田製薬 お客様相談窓口
電話 06-6351-2100 (代表)
受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

製造販売元

📞 KUDA 奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号