

Ropon EX

vitamin B₁, B₆, B₁₂ with vitamin E

服用前に、この外箱をよくお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢、便秘
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

使用期限

製造番号

第3類医薬品

ロポンEX

ビタミンB₁B₆B₁₂主薬製剤

【効能又は効果】

- 次の諸症状の緩和: 神経痛、筋肉痛・関節痛(肩・腰・肘・膝痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労(慢性的な目の疲れ及びそれに伴う目のかすみ・目の奥の痛み)
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。」
- 次の場合のビタミンB₁B₆B₁₂の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法及び用量】

下記の量を食後すぐに水又はお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数*
成人(15歳以上)	2~3錠	1 回
15歳未満	服用しないこと	

◎定められた用法・用量を厳守してください。

【成分及び分量】 3錠中

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB₁誘導体) 109.16mg
(フルスルチアミンとして 100mg)
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 100.0mg
シアノコバラミン(ビタミンB₁₂) 1,500µg
ビタミンEコハク酸エステルカルシウム 103.58mg
(d α -トコフェロールコハク酸エステルとして 100mg)
ガンマ-オリザノール 10.0mg
添加物として、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、酸化チタン、CMC-Na、リボフラビンリン酸エステルNa、カルナウバロウを含有しています。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

本品に関するお問い合わせ先
オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06)6491-6222
電話受付時間: 月~金(祝日を除く) 9:00~17:00



ラフェルサ®

第3類医薬品

ビタミン B₁, B₆, B₁₂, E 配合

ラフェルサ®ロポンEX 240錠



製造販売元

オール薬品工業株式会社
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地

眼精疲労・肩こり・腰痛の緩和

ラフェルサ®ロポンEX 240錠

配合

ビタミン B₁, B₆, B₁₂, E

第3類医薬品

眼精疲労・肩こり・腰痛の緩和

ラフェルサ®