

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。



漢方製剤

ハイ・カッコー

(葛根湯エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

ハイ・カッコーは、葛根湯（かっこんとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、ぞくぞくとした寒けがしたり、のどが痛い、頭が痛む、熱がある、鼻水が出る、咳が出る、肩がこるなどの汗をかかない風邪の初期の症状の緩和に効果があります。なお、本剤には眠くなる成分は入っていません。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記のような重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる、水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる、高熱、のどの痛み等が持続したり、急激に悪化する。

3. 1ヵ月位（感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能 又 は 効 果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用 法 及 び 用 量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
（食間とは食後2～3時間を指します）

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成 分 及 び 分 量

本剤3包（1包2.5g）中に、次の生薬から抽出された葛根湯エキス3.3gが含まれています。

カッコン（葛根）……………4g	シャクヤク（芍薬）……………2g
マオウ（麻黄）……………3g	カンゾウ（甘草）……………2g
タイソウ（大棗）……………3g	ショウキョウ（生姜）……………1g
ケイヒ（桂皮）……………2g	

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保 管 及 び 取 扱 い 上 の 注 意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂 1-8-6

電話 (06) 6629-9058

受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）