



漢方製剤

# ケンショトウ

（小建中湯エキス製剤）

第2類医薬品

## 特 徴

ケンショトウは、小建中湯（しょうけんちゅうとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、血色が悪く、疲れやすい体力虚弱な人の滋養強壮剤ともいえるお薬で、とくに子供さんと、ときどき腹痛を訴えたり、ちょっとした運動で疲れやすく、神経質で、夜泣きやお寝しょをするという人に、すぐれた効きめがあります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 吐き気・嘔吐のある人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症 状                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や<br>こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が<br>あらわれ、徐々に強くなる。 |

- 3ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能又は効果

体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症：

小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

## 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。  
（食間とは食後2～3時間を指します）

| 年 齢       | 1 回 量           | 1 日服用回数 |
|-----------|-----------------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1 包             | 3 回     |
| 15歳未満7歳以上 | $\frac{2}{3}$ 包 |         |
| 7歳未満4歳以上  | $\frac{1}{2}$ 包 |         |
| 4歳未満2歳以上  | $\frac{1}{3}$ 包 |         |
| 2歳未満      | $\frac{1}{4}$ 包 |         |

### ＜用法及び用量に関連する注意＞

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分及び分量

本剤3包（1包4.2g）中に、

|            |      |           |    |
|------------|------|-----------|----|
| ケイヒ（桂皮）    | 2g   | カンゾウ（甘草）  | 1g |
| ショウキョウ（生姜） | 0.5g | シャクヤク（芍薬） | 3g |
| タイソウ（大棗）   | 2g   |           |    |

上記生薬より抽出された小建中湯エキス2.0g及びコウイ（膠飴）10gが含まれています。

＊添加物として、トウモロコシデンプン、ショ糖脂肪酸エステルを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

## 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 お客様相談室  
〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2  
電話（06）6629-0062  
受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2