



漢方製剤

バクニン

(麦門冬湯エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

バクニンは、麦門冬湯（ばくもんどうとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。本剤は、体力は普通か、あるいはやや虚弱な体質の人に用い、のどが乾燥していらいる刺激感があり、咳がはげしく、一度咳込むと連発して顔面が赤くなり、粘りのあるきれにくい痰が出る、とくに夜就寝したときにしやすい咳などの症状の気管支ぜんそく、気管支炎やしわがれ声に効果があります。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水様性の痰の多い人。
 - 高齢者。
 - 次の症状のある人。
むくみ
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（からげきに服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：

からげき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
(食間とは食後2～3時間を指します)

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3 回
15歳未満7歳以上	$\frac{2}{3}$ 包	
7歳未満4歳以上	$\frac{1}{2}$ 包	
4歳未満2歳以上	$\frac{1}{3}$ 包	
2歳未満	$\frac{1}{4}$ 包	

＜用法及び用量に関連する注意＞

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分及び分量

本剤3包（1包3.0g）中に、次の生薬から抽出された麦門冬湯エキス5.7gが含まれています。

バクモンドウ（麦門冬）	10g	ニンジン（人参）	2g
ハンゲ（半夏）	5g	カンソウ（甘草）	2g
タイソウ（大棗）	3g	コウバイ（粳米）	5g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

電話（06）6629-9058

受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2