

2023年3月初版

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

瞳の健康を考えた1回使い切りタイプ ティアーレ®シリーズ

ものもらい・結膜炎を治す

子ども ティアーレ® 抗菌

●生後3ヵ月のお子さまから使えます●

第2類医薬品

防腐剤フリー

目にやさしくしみにくい

1回使い切りでいつも清潔

子どもティアーレが目指したのは、涙です。

1回使い切りであること。防腐剤を使用しないこと。この2つが揃って、はじめて自信を持ってお子さまにおすすめできると私たちは考えています。子どもティアーレは、涙に近い点眼薬。1回使い切りタイプで、防腐効果を持たせる必要がありません。お子さまのデリケートな瞳を守るために開発された子どもティアーレは、生後3ヵ月からお使いいただけます。

抗菌成分サルファ剤

基準内最大濃度配合※により、
原因菌の増殖を抑えます。
スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%

抗炎症成分W配合

グリチルリチン酸二カリウムと
イプシロン-アミノカプロン酸が
目の炎症を効果的に鎮めます。

・ものもらい

・結膜炎
(はやり目)

・眼瞼炎
(まぶたのただれ)

・かゆみ



※ 眼科用薬製造(輸入)承認基準

保管・取扱い注意

・品質を保つため、保存する場合は内袋と箱に入れてください。

・本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
・長期連用しないでください。

相談すること

1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
・ はげしい目の痛み

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3 3~4日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

【用法・用量】 15歳未満、1回2~3滴、1日5~6回点眼する。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
- (3) コンタクトレンズを装用したまま使用しないでください。
- (4) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくりまわして開封してください。
(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



【成分・分量】 スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%

グリチルリチン酸二カリウム 0.2%

イブシロン-アミノカプロン酸 1.0%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ヒプロメロース、ヒアルロン酸Na、

pH調節剤を含有する。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 本品は、光による薬液の変質を防ぐため、着色袋を使用しておりますが、保存する場合は内袋と箱に入れるなど、光の当たらない所に保管してください。なお、冷蔵庫では保管しないでください。
- (3) 本品は、無色から微褐色の点眼薬です。使用時に微褐色に着色している場合がありますが、有効成分であるサルファ剤によるものですので、ご心配ありません。
- (4) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (5) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります。)
- (6) 他の人と共用しないでください。
- (7) 使用後に薬液が残っていても、再使用しないでください。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、一度内袋を開封した後はすみやかに使用してください。
- (9) 本剤を携帯する際、ズボンの後ろポケット等に入れないでください。
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)
- (10) 本剤を点眼後、口中に苦味または甘みを感じることがありますが、本剤の有効成分によるものですので、ご心配ありません。

0-204062-0