

消毒用エタノールイソプロ

外皮消毒剤

飲用不可

指定医薬部外品

外皮消毒剤

消毒用エタノール イソプロ

(エタノール76.9~81.4vol%を含む)

500mL

火気厳禁

第4類アルコール類 水溶性 危険等級Ⅱ

飲用不可

製造販売元
兼一薬品工業株式会社

大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号
電話番号 06-6471-3548

使用後の容器はつぶ
せますので、容器は
約1/4に減少します。



消毒用エタノールイソプロ

11.12

販売名：消毒用エタノールMIX「A」

使用に際しては、この説明書きをよくお読みください。

△使用上の注意

【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと
患部が広範囲の人、深い傷やひどいやけどの人
2. 次の部位には使用しないこと
損傷のある手指・皮膚、口唇等の粘膜の部分、目の周り（局所刺激作用があります）

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
1) 医師の治療を受けている人。
2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【效能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。

【用法・用量に間違する注意】

- (1) 用法・用量を守ること。
- (2) 本剤は希釈せず原液のまま使用すること。
- (3) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (6) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとで使用させること。
- (7) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (8) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分・分量】エタノール 76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (3) 直射日光のあたらない、なるべく涼しい所に密栓して保管すること。
- (4) 塗装された物に使用した場合、色が落ちる恐れがあります。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (6) 火気を近づけないこと。

製造番号・使用期限は底面に記載

消毒用エタノールイソプロ

400 APPROX.
300
200
100



容器: PE
キャップ: PP
ラベル: PET