

外皮用殺菌消毒剤



ステア®

医薬品

火気厳禁

【使用上の注意】

してはいけないこと

1. 次の部位には使用しないこと。
(守らないと現在の状況が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
損傷皮膚及び粘膜[刺激作用を有するため]
2. その他
再使用しないで下さい。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
①医師の治療を受けている人。②本人又は家族がアレルギー体質の人。
③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止しこの製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ

3. その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの判定を誤らせる事がある。

【成分・分量】(1箱中)

日本薬局方 イソプロパノール 112mL
日本薬局方 精製水 48mL
医療脱脂綿 32g



【用法及び用量】 そのまま塗擦、清浄用として用いる
【効能又は効果】 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

製造記号、使用期限は容器側面に記載

製造記号：側面上段記載 使用期限：側面下段記載



容 器:PP

フィルム:PP,PET

外 装:PE,PET



ラベル

製造販売元



川本産業株式会社

大阪市中央区糸屋町2丁目4番1号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956

(10:00~17:00 月~金 ただし祝祭日を除く)

<http://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

【用法及び用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【用法及び用量に関連する注意】

- 1) 外用にのみ使用すること。
- 2) 唇などの粘膜の部分や目の周りには使用しないこと。
- 3) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂綿による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 5) 広範囲又は長時間使用する場合には、気化したアルコールの吸引に注意すること。
- 6) 本剤は引火性があるため、火気（電気メス等を含む）に十分注意すること。
- 7) アルコールがたんぱく質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療機器等を清浄する際は血清、膿汁等を十分に洗い流してから使用すること。
- 8) 薬液の蒸発を防ぐため、開封後はすみやかに使用すること。又フタはきちんと閉めること。

【保管及び取扱上の注意】

- 1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- 2) 直射日光をさけ、なるべく涼しいところに保管すること。
- 3) 火気に近づけないでください。
- 4) 脱脂綿に小さな黒色又は黄色の斑点がある場合がありますが、これは綿花の葉や種子の一部で、変色したもの等ではありません。

開け口

