

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

バクモンドウ流エキス配合の鎮咳去痰薬 新カイゲンせき止め液W

医薬品

特 徴

かぜなどで“せき”が出るとき、多くの場合“たん”を伴いますが、これを排出させるために体力を消費し、また睡眠もさまたげられます。

新カイゲンせき止め液Wは、“せき”をしずめる成分に加え、“たん”を伴うせきによく効く生薬去痰成分のキキョウエキス、バクモンドウ流エキス配合の服用しやすい液剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 過量服用・長期連用しないでください
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気があらわれることがある。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

効 能

せき・たん

用法・用量

次の1回量を1日4回、毎食後および就寝前に服用してください。なお場合によっては1日6回まで服用してもよいが、この場合には約4時間の間隔をおいてください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	8才以上 ～11才未満	5才以上 ～8才未満	1才以上 ～5才未満
1回量	10mL	6.6mL	5mL	3.3mL	2mL

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満には服用させないでください。

成分と作用

60mL中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量	作 用
リン酸ジヒドロコデイン	30mg	せき中枢に働いてせきをしずめる。
dL一塩酸メチルエフェドリン	75mg	気管支をひろげ、せきをしずめる。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	気道粘膜についているたんをうすめて出しやすくすると共にせきをしずめる。
マレイン酸クロルフェニラミン	12mg	一般的に多いアレルギーが原因のせきに有効に作用する。
無 水 カ フ ェ イ ン	60mg	せきによる不快感を和らげて気分をそう快にする。
キ キ ヨ ウ エ キ ス (キキョウとして960mg)	240mg	共に生薬去痰成分で、これらに含まれる主成分のサポニンが、気管支を刺激して反射的に粘液の分泌を促し、粘稠なたんをうすめて流動をよくし、たんを出しやすくする。
● 添加物としてクエン酸、クエン酸Na、白糖、高果糖液糖、パラベン、安息香酸Na、デヒドロ酢酸Na、カラメル、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリンを含有する。		

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 使用後は、汚染を防ぐため、ピンのフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかな濁りを生ずることもありますが、効果には変わりありませんので、よく振ってからご使用ください。
- (6) 外箱に表示の期限内にご使用ください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

株式会社カイゲン お客様相談室 電話 06-6202-8911

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元

 株式会社 **カイゲン**

〒541-0045 大阪府中央区道修町2丁目5番14号

* 製造販売元

堺化学工業株式会社

〒586-0006 大阪府河内長野市松ヶ丘中町1330-1

Ⓒ 55145-7