

服用に際して、この説明文書を  
必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように  
大切に保管してください。

第②類医薬品

リーゼンバツハ顆粒(大入用)

リーゼンバツハ顆粒は、自然な便通を促す  
純植物性の便秘治療薬です。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり  
やすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しな  
いでください。  
他の瀉下剤(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用す  
る場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者  
にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことが  
ある人  
(4) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、直ちに服  
用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状            |
|------|---------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、こ  
のような症状の持続又は増強が見られた場合に  
は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者にご相談ください。  
下痢
4. 一週間位服用しても症状がよくなる場合は、服  
用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者にご相談ください。

裏面もご覧ください

## ◎効能又は効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

## ◎用法及び用量

次の量を、朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間)に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら、少しずつ増量又は減量してください。

| 年齢            | 1回量           | 1日の服用回数 |
|---------------|---------------|---------|
| 成人<br>(15歳以上) | 1/2さじ～<br>1さじ | 2回      |
| 15歳未満         | 服用しないでください    |         |

## ◎成分及び分量

1日量(2000mg)中

| 成分     | 分量     |
|--------|--------|
| センナ実   | 1125mg |
| 日局センナ末 | 375mg  |

添加物として、硬化油、CMC-Ca、乳糖、CMC-Na、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 大同製薬株式会社  
富山県高岡市三女子 113

発売元 株式会社ベリテ  
東京都千代田区東神田 2-9-8  
☎ 03-3862-1011

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
☎ 0120-149-931