

づつう
に
はいた

づつうに TRADE MARK はいたに
鯉膽丸本舗

ユ・ソラジン

頭痛/歯痛/神経痛

株式会社 きぬや薬舗
奈良県御所市今住475

づつう
に
はいた

づつう・はいたに ユ・ソラジン

づつう・はいたに **ユ・ソラジン**

医薬品 **ユ・ソラジン**

効能・効果

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・
 咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・
 腰痛・筋肉痛・肩こり痛・
 打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・
 月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。
 (2)悪寒・発熱時の解熱。

用法・用量

大人(15才以上).....1回4錠
 8才以上15才未満.....1回2錠
 5才以上8才未満.....1回1錠
 1日2回を限度とし、なるべく空腹時
 をさけて服用する。
 服用間隔は6時間以上おくこと。
 18錠入 ¥550.



●頭痛に



●歯痛に



●肩こりに



有効成分 1日量(8錠)中

日局 アセトアミノフェン.....600mg
 日局 エテンザミド.....600mg
 日局 無水カフェイン.....120mg
 添加物:バレイショデンプン、乳糖、ヒドロキシブ
 ロピルセルロース、カルメロースカルシウム、ス
 テアリン酸マグネシウム、タルク

保管及び取扱い上の注意

- (1)小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (2)服用に際しては添付文書をよく読んで下さい。
- (3)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (4)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (5)錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。
- (6)配置期限の過ぎた製品は、服用しないで下さい。

◆ニューソラジン使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用時は飲酒しないこと

4. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）