

和漢生薬の胃腸薬

りなんがん

きぬや 鯉膽丸

登録商標

- ・食べ過ぎ
- ・飲み過ぎ
- ・二日酔



製造発売元

株式会社 きぬや薬舗

お問い合わせ先 同上

奈良県御所市今住475番地

電話 0745-670-0016

きぬや 鯉膽丸

効能・効果

食欲不振、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胃もたれ、胸つかえ、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、嘔吐

用法・用量

大人(15才以上)……1回30粒 8才以上15才未満……1回15粒
5才以上8才未満……1回10粒 3才以上5才未満……1回 7粒
3才未満の乳幼児には、服用させないで下さい。
いずれも1日3回毎食後服用して下さい。

用法・用量に関する注意

- (1) 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないように、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法及び用量を厳守して下さい。

成分・分量

センブリ末	50mg	ケイヒ末	900mg
オウレン末	150mg	ゲンノショウコ末	900mg
オウバク末	600mg	ロートエキス	30mg
ゲンチアナ末	300mg	動物 腫	30mg
添加物：ザリチル酸、寒梅粉、薬用炭、アラビアゴム末	(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)		

してはいけないこと

- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 胃腸鎮痛鎮痙薬
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。）

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族アレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。心臓病、腎内障
2. 次の場合には、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
 - (2) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合
 - (3) 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること 口のかわき

関係部位	症状
皮	発疹・発赤、かゆみ

その他注意

母乳が出にくくなることがある。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。
- (5) 配置期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。



2包(30粒×2)

¥250