



Ritan

効 能

胃酸過多，胸やけ，胃部不快感，胃部・腹部膨満感，もたれ（胃もたれ），胃重，胸つかえ，げっぷ（おくび），はきけ（むかつき，胃のむかつき，二日酔・悪酔のむかつき，嘔気，悪心）嘔吐，飲み過ぎ（過飲），胃痛，胃弱，消化不良，食欲不振（食欲減退）

用 法 用 量

大人（15才以上）…………… 1回…………… 4錠
11才以上15才未満…………… 1回…………… 3錠
7才以上11才未満…………… 1回…………… 2錠
5才以上7才未満…………… 1回…………… 1錠
いずれも1日3回毎食後なるべく30分以内に服用する。

注 意

1. 小児の手のとどかない所に保管すること。
2. 服用に際しては、添付文書をよく読むこと。
3. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に密栓して保管すること。

Ritan

健胃胃腸薬



KINUYA YAKUHO CO.,LTD.
NARA, JAPAN



●容器の開け方、ツマミを
図の様に引きちぎって下さい。

Ritan

Ritan

成分分量 1日量(12錠)中

日局 ボレイ末	1000mg
// 炭酸水素ナトリウム	600mg
// オウレン末	200mg
// オウバク末	300mg
// ケイヒ末	300mg
// ショウキョウ末	75mg
// ソウジュツ末	200mg
賦形剤日局合成ケイ酸アルミニウム	90mg
// // バレイショデンプン	290mg
// // 乳糖	200mg
矯局剤 // カンゾウ粗エキス	50mg
蓄香剤 // 香料	微量
結合剤 // ヒドロキシビロピルセルローズ	15mg
滑沢剤 // タルク	40mg



製造番号

460錠

配置期限



製造発売元
株式会社 きぬや薬舗
奈良県御所市今住 475

成分分量 1日量(12錠)中	
日局ボレイ末	1000mg
✦ 炭酸水素ナトリウム	600mg
✦ オウレン末	200mg
✦ オウバク末	300mg
✦ ケイヒ末	300mg
✦ ショウキョウ末	75mg
✦ ソウジュツ末	200mg
賦形剤日局合成ケイ酸アルミニウム	90mg
✦ ✦ バレイショデンプン	290mg
✦ ✦ 乳糖	200mg
矯味剤 ✦ カンゾウ粗エキス	50mg
着香剤 ✦ 香料	微量
結合剤 ✦ ヒドロキシビロピルセルローズ	15mg
滑沢剤 ✦ タルク	40mg

製造番号

配置期限

Ritan

健胃胃腸薬

リタン

TRADE



MARK

鯉膽丸本舗

株式会社 きぬや薬舗

奈良県御所市今住475

効 能

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、胃弱、消化不良、食欲不振(食欲減退)

用 法 用 量

大人(15才以上)……………1回……………4錠
 11才以上15才未満……………1回……………3錠
 7才以上11才未満……………1回……………2錠
 5才以上7才未満……………1回……………1錠
 いずれも1日3回毎食後なるべく30分以内に服用する。