

効能・効果

せき・たん

きぬや鎮咳錠

製造販売元 株式会社 きぬや薬舗 奈良県御所市今住475番地 お問い合わせ先 同左 電話0745-67-0016

用法・用量

15才以上……………1回4錠 5才以上8才未満…1回1錠
8才以上15才未満…1回2錠 5才未満……服用しないこと
1日3回、白湯又は清水にて服用すること。

用法及び用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

有効成分 1日量(12錠)中

リン酸ジヒドロコデイン30mg、ノスカピン60mg
d,l-塩酸メチルエフェドリン75mg
マレイン酸クロルフェニラミン12mg
白色濃厚セキサノール1,000mg
添加物としてヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、テンブン、乳糖、タルクを含有する

してはいけないこと

 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
5才未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー薬)、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気があらわれることがある)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、口のかわき

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の折り口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



：外袋



：内袋

8錠 ￥300.