

せき／たん

ガイシ

「咳止」

成分分量 1日量(3包)中

日局 リン酸ジヒドロコデイン……………30mg
日局 dl-塩酸メチルエフェドリン……… 75mg
日局 ノスカピン……………30mg
日局 マレイン酸クロロフェニラミン…7.5mg
白色濃厚セキサノール…………… 1,000mg
添加物としてバレイショデンプン、
乳糖、セルロース、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、カルメロースCaを
含有する。



製造販売元 株式会社 きぬや薬舗 奈良県御所市大字今住475
お問い合わせ先 同上 土、日、祝日を除く 9:00~16:30 電話0745-67-0016



医薬品

効能又は効果

せき・たん

用法及び用量

大人15才以上1回……………1包
11才以上15才未満1回…………… $\frac{3}{4}$ 包
8才以上11才未満1回…………… $\frac{1}{2}$ 包
5才以上8才未満1回…………… $\frac{1}{4}$ 包
1日3回食後なるべく30分以内に白湯または清水にて服用する。

注意

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2)用法及び用量を厳守すること。

使用上の注意

してはいけないこと

1. 次の人は服用しないで下さい
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)鎮静薬、塩酸フェニルプロパノールアミンを含有する鼻炎用内服薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師に相談すること。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。

- (4)高齢者。
- (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7)次の症状がある人。高熱、排尿困難
- (8)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師又は薬剤師に相談すること。

- (1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止、医師、薬剤師に相談すること。
便秘、口のかわき

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の折り口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

2包(1.0g×2)入 ￥250.