

**ZEPHARMA**  
ゼファーマ

伸縮自由自在で  
貼りやすい

**インドメタシン含有パップ剤**

**キユウメタシンパップH**

**12枚入**  
(14cm×10cm)

医薬品

インドメタシン含有パップ剤

キユウメタシンパップH



肩こりによる


**肩の痛み、腰痛、関節痛に  
患部に温かい、インドメタシンパップ。**

あたた  
**温かいタイプ**

トウガラシエキスを配合

サロメチン配合

インドメタシンパップH



発売元: ゼファーマ株式会社  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-7-1

製造販売元: 救急薬品工業株式会社  
〒939-0351 富山県射水市戸成32-7

## インドメタシン含有パップ剤

## キエキエパップ剤

鎮痛消炎薬

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう保管してください。

## 【成分・分量】

100g(1000cm<sup>2</sup>/中

| 成分      | 分量     | はたらき                                |
|---------|--------|-------------------------------------|
| インドメタシン | 0.375g | 患部の痛み(原因となる物質の生成を抑え、鎮痛・消炎効果をあらわします。 |

(添加物)オレイン酸・シリルベート80、ヒマシ油、ゼラチン、カオリン・メントール、メタリン酸Na、1,3-ブチレンジオール、アクリル酸デンプン、ポリアクリル酸部分中和物、メタクリル酸、アクリル酸、チルコポリマー、D-ソルビトール、pH調整剤、酸化チタン、水酸化Al、Mg、BHT、香料、トウガラシエキス

【効能・効果】 腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、肩こりによる肩の痛み

## 【用法・用量】

| 年齢    | 用法・用量                  |
|-------|------------------------|
| 11歳以上 | 1日2回を限度として患部に貼付してください。 |
| 11歳未満 | 使用しないでください。            |

## 【用法・用量に関連する注意】

(1) 本剤は、痛みやほれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやほれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(2) 定められた用法・用量を遵守してください。(3) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 患部が汗等でぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(6) 連続して2週間以上使用しないでください。

## 【その他の注意】

本剤は添加物として、温感を与えるトウガラシエキスを配合されていますので、以下のことに注意してください。

(1) 打撲、捻挫の場合には、はれや熱がひどいから使用しないでください。(2) 本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じる場合があります。(3) 本剤に貼れた手で、目の周囲、口唇、鼻、その他の粘膜に触らないでください。(4) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。熱感で痛みを感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にはがしてください。また、入浴後は、30分経ってから使用してください。

【包装】 12枚入り(14cm×10cm)

## 〈お問い合わせ先〉

(1) 購入した薬局、薬店  
(2) ゼファーマ株式会社 お客様相談室  
電話番号 03-3661-2010  
受付時間 月~金曜日 9:00~17:00(祝日、年末年始を除く)

## ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと重症の症状が悪化し、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
  - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
  - (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
  - (3) 水虫、たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用しないでください

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状                           |
|------|------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感 |

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 使用の原因になったり品質が変わることがあります(4) 未使用分は袋のチャックをしっかり締めて保管してください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

ゼファーマ ホームページ <http://www.zepharma.com>

使用期限

製造番号