

第一三共ヘルスケア


伸縮自由自在で
貼りやすい

24枚入
(14cm×10cm)

インドメタシン含有パップ剤

キュウメタシン[®]パップH

第2類医薬品



肩こりによる

肩の痛み、腰痛、関節痛に
患部に温かい、インドメタシンパップ。

あたた
温かいタイプ
トウガラシエキスを配合

インドメタシン含有パップ剤

第2類医薬品

鎮痛消炎薬

キュウメタシンパップH

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。また、必要などをに読めるよう保管してください。

【成分・分量】
100g (1000cm²) 中

成分	分量	はたらき
インドメタシン	0.375g	患部の痛みの原因となる物質の生成を抑え、鎮痛・消炎効果をあらわします。

(添加物:オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、ヒマシ油、セラチン、カオリン、トメントール、メタリン酸Na、1,3-ブチレングリコール、アクリル酸デンプン、ポリアクリル酸部分中和物、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、D-ソルビトール、pH調整剤、酸化チタン、水酸化Al/Mg、BHT、香料、トウガラシエキス)

【効能・効果】腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、捻挫、肩こりによる肩の痛み

【用法・用量】

年齢	用法・用量
11歳以上	1日2回を限度として患部に貼付してください。
11歳未満	使用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(2) 定められた用法・用量を遵守してください。(3) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5) 患部が汗等でぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(6) 連続して2週間以上使用しないでください。

【その他の注意】本剤は添加物として、湿感を与えるトウガラシエキスが配合されていますので、以下のことに注意してください。(1) 打撲、捻挫の場合には、はれや熱がひいてから使用してください。(2) 本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じることがあります。(3) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜に触らないでください。(4) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5) 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。熱感で痛みを感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にはがしてください。また、入浴後は、30分程してから使用してください。

【包装】24枚入り(14cm×10cm)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) 水虫・たむし等又は化膿している患部。
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 未使用分は袋のチャックをしっかりと締めて保管してください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.dalichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

使用期限



製造番号

押しあける

第一三共ヘルスケア

伸縮自由自在で
貼りやすい

12枚入
(14cm×10cm)

インドメタシン含有パップ剤

キュウメタシン[®]パップH

第2類医薬品



肩こりによる

肩の痛み、腰痛、関節痛に
患部に温かい、インドメタシンパップ。

あたた
温かいタイプ
トウガラシエキス配合

インドメタシン含有パップ剤

第2類医薬品

鎮痛消炎薬

キユウメタシンパップH

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう保管してください。

【成分・分量】
100g(1000cm²)中

成分	分量	はたらき
インドメタシン	0.375g	患部の痛みとなる物質の生成を抑え、鎮痛・消炎効果をあらわします。

(添加物:オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、ヒマシ油、ゼラチン、カオリン、トメントール、メタリン酸Na、1,3-ブチレンジグリコール、アクリル酸デンプン、ポリアクリル酸部分中和物、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、D-ソルビトール、pH調整剤、酸化チタン、水酸化Al/Mg、BHT、香料、トウガラシエキス)

【効能・効果】腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、捻挫、肩こりによる肩の痛み

【用法・用量】

年齢	用法・用量
11歳以上	1日2回を限度として患部に貼付してください。
11歳未満	使用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

(1)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(2)定められた用法・用量を遵守してください。(3)11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(5)患部が汗等でぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(6)連続して2週間以上使用しないでください。

【その他の注意】本剤は添加物として、湿感を与えるトウガラシエキスが配合されていますので、以下のことに注意してください。(1)打撲、捻挫の場合には、はれや熱がひいてから使用してください。(2)本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じることがあります。(3)本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜に触らないでください。(4)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。熱感で痛みを感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前にはがしてください。また、入浴後は、30分程してから使用してください。

【包装】12枚入り(14cm×10cm)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は使用しないでください
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- 2.次の部位には使用しないでください
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)水虫・たむし等又は化膿している患部。
- 3.長期連用しないでください



相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

(2)5~6日間使用しても症状がよくなる場合

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)未使用分は袋のチャックをしっかりと締めて保管してください。(5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお問い合わせください。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

㊞登録商標

使用期限



製造番号

押しあける