

-----切り取り線-----

消炎・鎮痛パップ剤

スキルフクールA

6枚入(14cm×10cm)

殿

年 月 日

使用期限

製造番号

ご使用前に次の説明を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう保管してください。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

⚠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人。
 - (3) 本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔成分・分量〕 本品の膏体100g中

サリチル酸エチレングリコール…………… 0.5g
 l-メントール…………… 0.3g
 dl-カンフル…………… 0.2g
 ハッカ油…………… 0.2g
 グリチルリチン酸二カリウム…………… 0.02g
 添加物としてカオリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソル
 ビトール、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、
 アクリル酸デンプン、1,3-ブチレングリコール、ポリア
 クリル酸Na、水酸化Al/Mg、オレイン酸ソルビタン、
 ポリソルベート80、pH調整剤、メタリン酸Na、チモ
 ルを含有する。

〔効能・効果〕

打撲、ねんざ、腰痛、肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、
 関節痛、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

薬面のフィルムをはがし、1日1～3回患部に貼って
 ください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を遵守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導
 監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、
 よく拭き取ってから使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管し
 てください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入替えないでください。(誤用の
 原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用後は袋の切り口を折りまげて、外気に
 ふれないように保存してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 救急薬品工業株式会社 お問い合わせ先：お客様相談窓口
 富山県射水市戸破32番地7 電話番号 0766-56-9901

