

ツキロン かゆみどめパッチ

●●● ツキロン[®] 特納用
かゆみどめパッチ

23 パッチ
大・小2サイズ

虫さされに
効くパッチ



●水につよい、ムレにくい

ZEPHARMA
ゼファーマ

お子様の
かきこわし
防止に



ツキロン かゆみどめパッチ

医薬品 ツキロン[®] かゆみどめパッチ

23 パッチ
大・小2サイズ

23パッチ
23パッチ

アレルギー性皮膚炎の薬

目薬

この外箱は本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読みください。

虫さされかゆみに

マキロンかゆみどめパッチ

【副作用】

※【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

傷口、湿潤(掻き壊し)、ただれ、かぶれ。

■【押さえること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
咽部	かゆみ、色紫沈着

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチを患部からはがし、1日数回患部に貼ってください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 定められた用法・用量を遵守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。(5) 同じ患部に長時間の使用はさけてください。

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	量	注 意
リファンピラジン	1.5g	かゆみを治します。(付・ステロイド剤)
クロロブチン	0.5g	かゆみを治します。(付・ステロイド剤)
クロロブチン	0.5g	かゆみを治します。(付・ステロイド剤)
イソプロピルメチルフェニール	1.0g	皮膚作用が強い成分。(付・ステロイド剤)

(添加物:メタクリル酸・アクリル酸・ブチルコポリマー、BHT、トメントール)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 貼付の経路に当たったり品質が変わることがあります。(5) 貼付の際にはアルミ箔の切り口を折り上げて保管してください。(6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 23パッチ(面積2.0cm×2.1cm)パッチ、直径2.5cm×2.1cm(1シート)

(お問い合わせ先)

ゼファーマ株式会社 お客様相談室

電話番号 03-3561-2010

受付時間 月～金曜日 9:00～17:00(休日、年末年始を除く)

製造元

ゼファーマ株式会社

〒112-0222 東京都千代田区日本橋本町1-7-1

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒109-0291 東京都港区赤坂2-2-7

紙

製造番号

使用期限

押してあける