



貼るかゆみどめ

マキロン[®] かゆみどめパッチ

殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
- お子様のかきこわし防止

第一三共ヘルスケア

虫さされ、
かゆみに

肌色
パッチ

46
枚入り

大・小2サイズ



Daiichi Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

マキロン かゆみどめパッチ

【効能・効果】

この外箱は、本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読み下さい。

虫さされ・かゆみに

マキロンかゆみどめパッチ

【鎮痒消炎薬】

△(使用上の注意)

❌してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい

傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分 別	はたらき
ジフェニドラミン	1.00g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.50g	炎症を抑えます。(消炎剤)
クロタミトン	5.00g	かゆみを抑えます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェニール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

(添加物:メタクリル酸、アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール)

【保管および取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(換用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】46枚

(直径2.0cm×42枚、直径2.5cm×4枚)

⑨登録商標

押しあける

使用期限

製造番号



4 987107 606389

