



貼るかゆみどめ

肌色
パッチ

46
枚入り


大・小2サイズ

虫さされ、
かゆみに

アキロン[®] かゆみどめパッチ

第3類医薬品

殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
- お子様のかきこわし防止



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア



この外箱は、本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読み下さい。

虫さされ・かゆみに

マキロンかゆみどめパッチ

第3類医薬品

鎮痒消炎薬

⚠(使用上の注意)

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい

傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。

《用法・用量に関連する注意》

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.00g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.50g	炎症を抑えます。(消炎剤)
クロタミトン	5.00g	かゆみを抑えます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

(添加物:メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール)

【保管および取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 46枚

(直径2.0cm×42枚、直径2.5cm×4枚)

®登録商標



使用期限

製造番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



押
し
あ
け
る

マキロン®

第3類医薬品


特納用

かゆみどめパッチ

23パッチ
大・小2サイズ

虫さされに 効くパッチ

●水につよい、ムレにくい



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

お子様の
かきこわし
防止に



この外箱は本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読みください。

虫さされ・かゆみに

鎮痒消炎薬

マキロンかゆみどめパッチ 第3類医薬品

⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

傷口、湿潤(掻き壊し)、ただれ、かぶれ。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼ってください。

《用法・用量に関連する注意》

(1) 定められた用法・用量を遵守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけてください。

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。(消炎剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみを抑えます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

(添加物:メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管してください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 23パッチ(直径2.0cm×21パッチ、直径2.5cm×2パッチ)

®登録商標

押してあける

使用期限



製造番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



4 987107 604811