

●● マキロン

第3類医薬品

特納用

かゆみどめパッチ

23パッチ
大・小2サイズ



第一三共ヘルスケア

お子様の
かきこわし
防止に

虫さされに
効くパッチ

●水につよい、ムレにくい



〈お問い合わせ先〉
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電話 03 (5205) 8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造 救急薬品工業株式会社
販売元 富山県射水市戸破32-7

マキロン® かゆみどめパッチ

第3類医薬品

この外箱は本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読みください。

虫さされ・かゆみに

鎮痒消炎薬

マキロンかゆみどめパッチ 第3類医薬品

⚠ (使用上の注意)

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

傷口、湿潤(掻き壊し)、ただれ、かぶれ。

📞 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼ってください。
(用法・用量に関連する注意)

(1) 定められた用法・用量を遵守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけてください。

【成分・分量】 本品の膏体100g (1.25m²) 中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。(消炎剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみを抑えます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

(添加物: メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管してください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 23パッチ(直径2.0cm×21パッチ、直径2.5cm×2パッチ)

®登録商標

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



押してあける