

T939-0351 富山県射水市戸破32-7

この外箱は本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読みください。

パッチエース (経皮吸収剤)

【使用上の注意】

※【してはいけないこと】 (やういふと身元の皮膚が傷いたり、副作用が起こすやうな事があります)

1. 次の部位には使用しないでください
(1) 水疱 (水ぼうそう)、水虫、たむし等又は化膿している患部。(2) 目の周囲、粘膜等。(3) 傷口、湿潤 (掻き傷)、ただれ、湿疹、かぶれ。

2. 長期連用しないでください

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

皮膚症状	症 状
皮 膚	痒疹、発赤、かゆみ、ほれ
患 部	かぶれ、色黒化、水虫、たむし等の白濁症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

【効能・効果】虫さされによるかゆみ

【用法・用量】1日1～3回患部に貼ってください。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を遵守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。貼付部位にかぶれや色黒化などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。(5) 数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがしてください。(6) 同じ患所に長時間の使用はさけてください。

【成分・分量】本品の膏体100g (1.25m²) 中

成分	分量	注 意 事 項
酢酸デキサメタゾン	0.025g	かゆみや炎症を抑えます。(抗炎症剤)
ジフェニヒドラミン	1.00g	かゆみを抑えます。(H1-ヒスタミン拮抗剤)
イソプロピルメチルフェニール	1.00g	皮膚作用があります。(増進剤)
新製トコアルコール	0.50g	皮膚を保護し、薬の浸透を早めます。

(添加物) アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 保管の期間にふたり品質が変わることがあります。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】24パッチ (直径2.0cm)

押してあける

製造番号

使用期限

