



貼るかゆみどめ

半透明
パッチ

24
枚入り

赤くはれた
虫さされ、かゆみに

マキロン
パッチエース

殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
 - お子様のかきこわし防止
- 酢酸デキサメタゾン配合

第一三共ヘルスケア



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
救急薬品工業株式会社
〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

※本剤は、アレルギー性皮膚炎、虫さされ、かゆみ、湿疹、小児の発疹などに有効です。
※本剤は、アレルギー性皮膚炎、虫さされ、かゆみ、湿疹、小児の発疹などに有効です。
※本剤は、アレルギー性皮膚炎、虫さされ、かゆみ、湿疹、小児の発疹などに有効です。

マキロンパッチエース

殺菌剤配合

この外箱は、本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読み下さい。
虫さされによるかゆみに

マキロンパッチエース

殺菌剤配合

△〔使用上の注意〕

- × してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい (1) 水痘 (水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。(2) 目の周囲、粘膜等。(3) 傷口、湿潤 (かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ。2. 長期連用しないで下さい

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着、みずむし・たむし等の白腐症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりません

【効能・効果】 虫さされによるかゆみ

【用法・用量】 1日1～3回患部に貼って下さい。

〔用法・用量に関連する注意〕

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6) 同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】 本品の膏体100g (1.25m²) 中

成分	分量	はたらき
酢酸デキサメタゾン	0.025g	かゆみや炎症を抑えます。(抗炎症剤)
ジフェニヒドラミン	1.00g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェニール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行を促進し、傷口の治癒を早めます。

(添加物: アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸、アクリル酸、ポリブチレン、BHT、トメントール)

本剤は、0.1% 皮膚ホルモン (ステロイド) の酢酸デキサメタゾンを配合しています。

【保管および取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 24枚 (直径2.0cm)

® 登録商標

使用期限

製造番号



4 987107 606518



押
し
あ
け
る