



貼るかゆみどめ

半透明  
パッチ

24  
枚入り


# アキロン<sup>®</sup> パッチエース

第2類医薬品

殺菌剤配合

- 水につよく、ムレにくい
- お子様のかきこわし防止

デキサメタゾン酢酸エステル配合



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

赤くはれた  
虫さされ、かゆみに



この外箱は、本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読み下さい。

虫さされによる  
かゆみに

# マキロンパッチエース

鎮痒消炎薬

## ⚠(使用上の注意)

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないで下さい(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部。(2) 目の周囲、粘膜等。(3) 傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、しっしん、かぶれ。 2. 長期連用しないで下さい

## 🔥 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 患部が広範囲の人。  
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状                                     |
|------|-----------------------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ                            |
| 患 部  | かぶれ、色素沈着、みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

【効能・効果】 虫さされによるかゆみ

【用法・用量】 1日1～3回患部に貼って下さい。

《用法・用量に関連する注意》

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。(6) 同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m<sup>2</sup>)中

| 成分                             | 分量     | はたらき               |
|--------------------------------|--------|--------------------|
| デキサメタゾン酢酸エステル                  | 0.025g | かゆみや炎症を抑えます。(抗炎症剤) |
| ジフェンヒドラミン                      | 1.00g  | かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤) |
| イソプロピルメチルフェノール                 | 1.00g  | 殺菌作用があります。(殺菌剤)    |
| トコフェロール酢酸エステル<br>(ビタミンE酢酸エステル) | 0.50g  | 血行を促進し、傷口の治癒を早めます。 |

(添加物: アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール)

本剤は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

【保管および取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)  
(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。  
(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 24枚(直径2.0cm)

第2類医薬品

押しあける



® 登録商標

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

