



貼るかゆみどめ

半透明
パッチ

24
枚入り

赤くはれた
虫をされ、かゆみに

マキロン[®] パッチエース

第2類医薬品

殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
- お子様のかきこわし防止

デキサメタゾン酢酸エステル配合



Daichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

マキロンパッチエース

第2類医薬品

この外箱は、本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読み下さい。

虫さされによる
かゆみに

マキロンパッチェース

（外用剤）

⚠（使用上の注意）

❌ **してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の部位には使用しないで下さい（1）水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等または化膿している患部。（2）目の周囲、粘膜等。（3）傷口、湿潤（かきこわし）、ただれ、しっしん、かぶれ。 2. 長期連用しないで下さい

■ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談下さい

（1）医師の治療を受けている人。（2）本人または家族がアレルギー体質の人。（3）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。（4）患部が広範囲の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師にご相談下さい

（1）使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、ほれ
患 部	かぶれ、色素沈着、みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

（2）5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】 虫さされによるかゆみ

【用法・用量】 1日1～3回患部に貼って下さい。

（用法・用量に間違える注意）

（1）定められた用法・用量を守って下さい。（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。（3）外用にのみ使用して下さい。（4）汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。（5）数時間使用してかゆみがなくなれば、本剤をはがして下さい。（6）同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】 本品の膏体100g（1.25m²）中

成分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症を抑えます。（抗炎症剤）
ジフェニヒドラミン	1.00g	かゆみを抑えます。（抗ヒスタミン剤）
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。（殺菌剤）
トコフェロール酢酸エステル （ビタミンE酢酸エステル）	0.50g	血行を促進し、傷口の治癒を早めます。

（添加剤：アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸、アクリル酸、ブチルカルボキシマー、BHT、トメントール）

本剤は、副腎皮質ホルモン（ステロイド）のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

【保管および取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）（4）保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。（5）表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 24枚（直径2.0cm）

第2類医薬品

押しあける

紙

®登録商標

使用期限

製造番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931（フリーダイヤル）

