

マキロン®パッチエース

第2類医薬品



貼るかゆみどめ

半透明
パッチ24
枚入りマキロン®
パッチエース赤くはれた
虫さされ、かゆみに

第2類医薬品

殺菌剤配合



- 水につよく、ムレにくい
- お子様のかきこわし防止

デキサメタゾン酢酸エステル配合



第一三共ヘルスケア



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社

富山県射水市戸破32-7



G 登録商標

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

△ 使用上の注意

- × **【してはいけないこと】** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないで下さい。(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし(みずむし)等又は化膿している患部(2) 目の周囲、粘膜炎(3) 傷口、潰瘍(かきこわし)、ただれ、しそり、かぶれ (2. 顔面には、広範囲に使用しないで下さい。 3. 長期連用しないで下さい。)

△ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が広範囲の人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますが、すぐに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・みずむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

虫さされによるかゆみに
マキロンパッチエース
(成分・分量) 本品の膏体100g(1.25m²)中

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

成 分	分量	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.025g	かゆみや炎症をおさえます。(抗炎症剤)
ジフェニドラミン	1.00g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
イソプロピルメチルフェニール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE酢酸エステル)	0.50g	血行促進作用により、皮膚の新陳代謝をよくします。

添加物: アジピン酸ジイソプロピル、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール
本剤は、副腎皮質ホルモン(ステロイド)のデキサメタゾン酢酸エステルを配合しています。

(効能・効果) 虫さされによるかゆみ

(用法) 1日1～3回患部に貼って下さい。

(使用法に關連する注意) (1) 使用法を厳守して下さい。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

(3) 外用にのみ使用して下さい。

(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。

(5) 数時間使用してかゆみが

取くなれば、本剤をはがして下さい。

(6) 同じ場所に長時間の使用はしないで下さい。

(保管及び取扱上の注意) (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。

(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

(包装) 24枚(直径2.0cm×24枚)

使用期限

製造番号

4 987107 606518

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

(お問い合わせ先) 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.daichisanryo-hc.co.jp/>