

マキロン® かゆみどめパッチP

第3類医薬品

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

36  
枚入り

貼るかゆみどめ

第3類医薬品



マキロン®  
かゆみどめパッチP

殺菌剤配合

イラスト入り



虫さされ、  
かゆみに

- かきこわし防止
- 水につよく、ムレにくい

第一三共ヘルスケア



〈お問い合わせ先〉  
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
電話 03(6667)3232  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



Daiichi-Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

救急薬品工業株式会社

〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

この外箱は、本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読み下さい。

虫さされ・かゆみに

## マキロンかゆみどめパッチP

第3類医薬品

鎮痒消炎薬

### △〔使用上の注意〕

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい

傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ。

Ⓜ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談下さい  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師にご相談下さい

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 患部   | かぶれ、色素沈着     |

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。

《用法・用量に関連する注意》

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m<sup>2</sup>)中

| 成 分            | 分 量   | はたらき               |
|----------------|-------|--------------------|
| ジフェンヒドラミン      | 1.00g | かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤) |
| グリチルレチン酸       | 0.50g | 炎症を抑えます。(消炎剤)      |
| クロタミトン         | 5.00g | かゆみを抑えます。(鎮痒剤)     |
| イソプロピルメチルフェノール | 1.00g | 殺菌作用があります。(殺菌剤)    |

(添加物:メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 36枚(直径2.0cm×36枚)

® 登録商標

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

使用期限

製造番号



For sale  
in Japan  
Only

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・  
ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon



押  
し  
あ  
け  
る