

36
枚入り

貼るかゆみどめ

第3類医薬品

マキロン®
かゆみどめパッチP

殺菌剤配合

イラスト入り

虫さされ、
かゆみに

- かきこわし防止
- 抗炎症成分を配合
- 水につよく、ムレにくい

第一三共ヘルスケア



（お問い合わせ先） 第一三共ヘルスケア株式会社 薬事部相談室
 郵 箱 03(5205)8331
 受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）
 マキロンについて詳しくは www.makiron-s.jp



Daiichi Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

救急薬品工業株式会社

富山県射水市戸破32-7

医薬品目録E薬

マキロン かゆみどめパッチP

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
 また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痒消炎薬

△使用上の注意

- ❌ **してはいけないこと**（「すらないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります」）

次の部位には使用しないで下さい。

傷口、湿潤（かきこわし）、ただれ、かぶれ

★相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着

(2) 5～6日間使用し

【効能・効果】 虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】 パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。

【用法・用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を守って下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけて下さい。

【成分・分量】 本品の膏体100g(1.25m)中

成分	分量	はたらき
ジフェニヒドラミン	1.00g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.50g	炎症を抑えます。(抗炎症剤)
クロタミトン	5.00g	かゆみを抑えます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.00g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

添加物：メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

【包装】 36枚(直径2.0cm×36枚)

紙

押しあける

®登録商標

副作用被害救済制度のお問い合わせ先(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話0120-149-931(フリーダイヤル)



61059