

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品

漢方製剤

のどがはれて痛む扁桃炎・扁桃周囲炎に 〔救心漢方〕桔梗湯エキス散

〔救心漢方〕桔梗湯エキス散は、漢方医学の原典『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている「桔梗湯」をのみやすい微粒状のエキス散剤としたものです。

「桔梗湯」は、のどの痛みに使用する「甘草湯」に、消炎効果のある「桔梗」を加えた薬方で、のどが赤くはれて痛む扁桃炎や扁桃周囲炎などに用いられます。

◆〔救心漢方〕桔梗湯エキス散は、次のような症状(扁桃炎・扁桃周囲炎)を目標として使用すると、すぐれた効きめを発揮します。

- ◇かぜなどにより、のどが赤くはれて痛む
- ◇のどの使いすぎで、のどがはれて痛む
- ◇気候の急激な変化によって、のどがはれて痛む
- ◇のどのはれや痛みで、異物感があり、ものをのみ下しにくい
- ◇のどがはれて、声がかすれ、せき せき 咳 たん や痰が出る

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕
次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の症状のある人
 むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人
 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しづれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

用法・用量

食前または食間に少しづつ口の中に含み、水またはお湯で徐々に溶かして服用すること

年齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	1包	1日3回
7～14才	2/3包	
4～6才	1/2包	
2～3才	1/3包	
2才未満	1/4包	

一食間とは…
食後2～3時間
を指します。

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
(2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること

【効果的なのみ方】

本剤は、一息にのみほさずに、少しづつ口に含み、水またはお湯でゆっくり溶かすようにしておのみください。有効成分が炎症を起こしているのどに直接作用して、より効果的です。

成 分

[救心漢方] 桔梗湯エキス散は、黄かつ色の微粒状の散剤で、3包(1包1.5g)中、下記生薬の抽出乾燥エキス(桔梗湯乾燥エキス)1,470mgを含有します。

[キキョウ]……………2.0g、[カンゾウ]……………3.0g]

添加物として乳糖、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸を含有します。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
(2) 小児の手の届かない所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）
(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話：03-5385-3211（代表）

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日を除く）



救心製薬株式会社

東京都杉並区和田1-21-7