

動悸があり神経のたかぶる方に

ノイ・ホスロール

NEU·HOSROL

複雑な現代社会の中では、心身共にストレスを受ける機会が多く、神経がたかぶってイライラしたり、動悸を感じたりすることが少なくありません。ストレスがたまってくると、このような症状ばかりでなく、自律神経の働きやホルモンのバランスが乱れ、精神的にも肉体的にもさまざまな支障をきたすようになります。

また、試験や会議の前に、あるいは人前で話をするときなどに、緊張して神経がたかぶったり、胸がドキドキすることもよくあることです。

〈ノイ・ホスロール〉は、ブクリョウ(茯苓)、ケイヒ(桂皮)、タイソウ(大棗)、カンゾウ(甘草)の4種の生薬からつくられた製剤で、このようなストレスなどによって起こる神経のたかぶりや動悸などにすぐれた効きめをあらわします。

〈ノイ・ホスロール〉は、植物生薬の抽出エキスを成分とした服用しやすい顆粒剤で、分包剤ですので携帯にも便利です。

⚠使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる〕
次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

むくみ

(6) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること

効 能

動悸があり神経のたかぶるもの

用法・用量

食前または食間に水またはお湯で服用すること。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回
7～14才	$\frac{2}{3}$ 包	
4～6才	$\frac{1}{2}$ 包	
2～3才	$\frac{1}{3}$ 包	
2才未満	$\frac{1}{4}$ 包	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成 分

〈ノイ・ホスロール〉は、淡黄かっ色の顆粒で、3包(1包2g)中、下記植物生薬の抽出乾燥エキス2,100mgを含有します。

〔ブクリョウ……6.0g、ケイヒ……4.0g〕
〔タイソウ……4.0g、カンゾウ……2.0g〕

添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチを含有します。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話:03-5385-3211(代表)

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土、日、祝祭日を除く)



救心製薬株式会社

東京都杉並区和田1-21-7