

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

下痢止め

快腸はら薬S

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人
血便のある人又は粘液便の続く人
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人 (本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります)
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (5) 高齢者
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状のある人
排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人
心臓病、緑内障
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関 係 部 位 | 症 状 |
|---------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 令	1 回量	1 日服用回数
15才以上（大人）	30丸	服用間隔は 4 時間以上 おいて 3 回まで
11才以上15才未満	20丸	
8 才以上11才未満	15丸	
5 才以上 8 才未満	10丸	
5 才未満	服用しないでください	

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

30丸×3包（1日量）中、次の成分を含みます。

成 分	含 量
タンニン酸ペルベリン	300mg
ゲンノショウコ末	510mg
センブリ末	90mg
ロートエキス散20%	150mg (ロートエキス30mgに相当)

添加物として、炭酸Ca、デヒドロ酢酸Na、アルファー化トウモロコシデンプン、カルメロースCa、乳糖水和物、タルク、酸化チタン、アラビアゴム、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、黄色4号（タートラジン）及び赤色3号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

共栄製薬株式会社「お客様相談係」

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

〒939-1275 富山県高岡市中田4576番地

電話 (0766) 36-0081