

05.04 △使用上の注意

❌ **してはいけないこと** 次の人は使用しないこと

- (1) ヨードに対し過敏症の既往歴のある人。
- (2) 甲状腺疾患のある人。

⚠ **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬により、アレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 口内のただれがひどい人。
- (5) 妊婦、妊娠していると思われる婦人又は授乳中の婦人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること。

- (1) 本剤の使用中止又は使用後、次の症状があらわれた場合。

皮膚：発疹・発赤、かゆみ

消化器：不快感、悪心、吐気、口内のあれ、しみる、灼熱感、口内の刺激

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

ショック：使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

アナフィラキシー様症状：胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 4～5日使用しても症状の改善が見られない場合。

【用法・用量】

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布して用いる

用法及び用量に関連する注意

- (1) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、アッと声を出しながら、2～3回直射してください。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れがえないこと。
- (4) 衣服などに付着した場合、水が洗剤となるべく早く洗い落とすこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) ノズルの先端の穴を針等で突かないこと。
- (8) 冬季など気温の低い時に、中味の粘度が高くなり、噴射しにくくなることがありますので、手の中で少し温めてからお使いください。

ご使用に際して、中に入っている説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

安心

特殊ノズルで、液だれしない

便利

オーバーキャップ付で持ち運びに便利



開け方



図のようにキャップの側面を押すと開けやすくなります。

※最初にお使いになる時は、液がでるまで4～5回程空押しをしてください。

【効 能】

のどの炎症によるのどあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

【成分・分量】(本品30ml中)

日局ポビドンヨード：135mg

はたらき：のどを殺菌消毒します

添加物：グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、ヨウ化カリウム、香料

◆使用期限・製造番号は底面に記載しています。

医薬品

ノンガスタイプ
30ml



製造販売業者

共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

お客様相談室 ☎0744-52-4741

受付時間9:00～17:00(土・日・祝を除く)