

計量カップ付で便利

本剤をご使用になる前に、下記の説明文書を必ずお読みください

洗口うがい剤 ポピクルG 120mL

うがい薬

ポピクルG 120mL

効能：
のどの殺菌・消毒
洗浄、口臭の除去

医薬品 成分：日局ポビドンヨード



うがい以外には使用せず、ご使用の際は
【用法・用量】を守って正しくお使いください

05.01 △ 使用上の注意

※ してはいけないこと

次の人は使用しないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ヨードに対し過敏症の既往歴のある人。
- (3) 甲状腺疾患のある人。

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 口内のただれがひどい人。(5) 妊婦、妊娠していると思われる婦人又は授乳中の婦人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 本剤の使用後又は使用中、次の症状があらわれた場合。

関係部位	口	消化器	その他
症状	あれ、しみる、灼熱感、刺激感	悪心	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。(4) 衣服などに付着した場合、水か洗剤でなるべく早く洗い落とすこと。(5) 火気に近づけないこと。(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

効 能

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回、本剤2～4mLを水約60mLに薄めて、1日数回うがいをしてください。

【用法及び用量に関連する注意】

(1) 定められた用法・用量を守ること。(2) うがいのみに使用し、内服しないこと。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

成分・分量 (本品100mL中)

成 分	含 量
日局ポビドンヨード	7g (有効ヨウ素700mg)
はたらき	
のどを殺菌消毒します	

添加物：エタノール、グリセリン、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム、D-メントール

【成分及び分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

医薬品

お問い合わせ先

製造販売業者



共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

お客さま相談室 ☎0744-52-4741

受付時間9:00～17:00(土・日・祝を除く)



4 987059 065173