

使用に際してはこの添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## キズリバテープ S X

第3類  
医薬品

### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
本品の使用後又は使用中、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

### 効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

### 用法・用量

布の部分を患部に当て貼付する。

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- (3) 粘着面を患部に貼らないこと。
- (4) 長時間貼付したり、急激にはがしたりしないこと。(皮膚刺激の発生原因になります)
- (5) 刺激に弱い目の周囲、顔面等やわらかい皮膚面には注意して使用すること。

### 成分・分量

有孔ポリフィルム付不織布 100g(0.909 m<sup>2</sup>)にベンザルコニウム塩化物 100mg を含有

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 患部に石けんが残っていると殺菌・消毒効果が低下するので、充分水で洗い流した後、よくふき取ってから使用すること。

お問い合わせ先

製造販売業者



共立薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町清水谷 1085 番地

お客さま相談室 0744-52-4741

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

0120-149-931(フリーダイヤル)