

総合感冒薬エース微粒

本剤は、「かぜ」に対応して、ねつ、頭痛、せき、鼻、のど、体の節々の痛みの症状を抑える各種成分と共に消耗を防ぐビタミンB₁・B₂等、8種の有効成分を配合した総合かぜ薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。
3. 服用後、眠気があらわれることがあるので乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 高熱や排尿困難の症状のある人。
 - (8) 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害、糖尿病、高血圧の診断を受けた人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦し さ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の 激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあら われる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等が あらわれる。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜ ん そ く	

（2）5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3.口がかわく症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

●効 能

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

●成分・分量 3包中(1包 1,200mg)

アセトアミノフェン……………900mg（発熱、頭痛、のどの痛みなど熱と痛みを鎮めます）
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg（気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきを鎮めます）
 チベジンヒベンズ酸塩……………50mg（せきの中枢に作用して、せきを鎮めます）
 クロルフェニラミンマレイン酸塩……………7.5mg（くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの症状をおさえます）
 グアイフェネシン……………200mg（のどにからんだ、たんを出やすくします）
 無水カフェイン……………75mg（頭痛を鎮めます）
 チアミン硝化物……………20mg（ビタミンB₁、かぜの時に消耗しやすいビタミンを補給します）
 リボフラビン……………4mg（ビタミンB₂、かぜの時に消耗しやすいビタミンを補給します）
 添加物として、沈降炭酸カルシウム、セルロース、乳糖水和物、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、グリチルリチン酸二カリウムを含有します。

●用法・用量

成人（15歳以上）……………1回 1包 11歳以上15歳未満……………1回²/3包
 7歳以上11歳未満……………1回¹/2包 3歳以上 7歳未満……………1回¹/3包
 1歳以上 3歳未満……………1回¹/4包 1歳未満は服用しないでください。

1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

注意・定められた用法・用量を厳守してください。

- ・2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。
- ・小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光や高温をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）誤用の原因や品質が変わることがありますので、他の容器に入れかえないでください。
- （4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- （5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

 0120-468771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号