

販売名：ビタラッシュ内服液

【使用上の注意】【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 軟便、下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】●次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精

疲労●脚気「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」●次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】

大人（15歳以上）1回1本（50mL）を1日2回服用する。

●用法及び用量を厳守すること。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

肉体疲労時のビタミンB₁補給

肩こり痛 腰痛の緩和

50mL

第3類
医薬品

コンドロイチン
400
mg
(1日量配合)

ビタミンB₁誘導体
60mg
(1日量配合)

ビタラッシュ内服液

【成分・分量】

1日量〔100mL（50mL×2）〕中
ベンフォチアミン（ビタミンB₁誘導体）
60mg、リボフラビン（ビタミンB₂）
4mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）
40mg、ニコチン酸アミド60mg、
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
400mg、添加物としてクエン酸、DL-
リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息
香酸、エデト酸カルシウム二ナトリウム、
香料を含有します。●本剤に配合されて
いるリボフラビンにより、尿が黄色になる
ことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に
保管すること。(2) 小児の手の届か
ない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ
替えないこと（誤用の原因になったり品質
が変わる。）。(4) 使用期限の過ぎた製品は
服用しないこと。



製造販売元

Kinyo 金陽製薬株式会社

奈良県五條市住川町1420番地

TEL 0747-22-3451

ガラス：ビン、金属：キャップ

使用期限

Lot No.