

第2類医薬品

満量処方

かぜ漢方内服液DX

葛根湯

1日分3本入

眠くなる成分が
入っていない

鼻かぜ・頭痛・肩こり
感冒の初期

眠くなる成分が
入っていない



CAINZ

14011A

第2類医薬品

眠くなる成分が
入っていない
かぜ漢方内服液DX

葛根湯

満量処方



CAINZ

30mL×3

1日分3本入

第2類医薬品

満量処方

かぜ漢方内服液DX

葛根湯

1日分3本入

眠くなる成分が
入っていない

鼻かぜ・頭痛・肩こり
感冒の初期

眠くなる成分が
入っていない

販売名：
かぜ漢方内服液DX

第2類医薬品

△ ご使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難
2. 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
3. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5〜6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能・効果】

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 次の量をよく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1本	1日3回(食前)
15才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量90mL(30mL×3本)中

葛根湯濃縮液 60mL

白局カッコン..... 8.0g	白局ジャクヤク..... 3.0g
白局マオウ..... 4.0g	白局カンソウ..... 2.0g
白局タイソウ..... 4.0g	白局ショウキョウ..... 1.0g
白局ケイヒ..... 3.0g	

添加物として白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、安息香酸ナトリウム、プロピレングリコール、香料、アルコール、グリセリン、ニコリン、エチルニコリンを含有します。

【成分・分量に関連する注意】

生薬成分を含むため、沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 服用に際しては、この説明文書をよく読んでください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かぬ所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (5) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

眠くなる成分が
入っていない
かぜ漢方内服液DX
葛根湯

滴量処方

鼻かぜ
頭痛
肩こり
感冒の初期
第2類医薬品

CAINZ

使用期限

Lot No.

30mL×3本(1日分)



よく振ってから服用してください。



製造販売元 KINYO 金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451