

販売名:ケンラク内服液

使用上の注意 【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【関係部位:消化器】 症状:吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること／軟便、下痢
3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 ●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労●脚気[ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。]●次の場合のビタミンB₁の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

大人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日2回服用する。

●用法及び用量を厳守すること。

成分・分量 1日量[100mL(50mL×2)]中

ベンフォチアミン(ビタミンB₁誘導体)60mg、リボフラビン(ビタミンB₂)4mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)40mg、ニコチン酸アミド60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム400mg

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸、エデト酸カルシウムナトリウム、香料、アルコール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリンを含有します。

●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

使用期限

Lot No.

お問い合わせ先
テイクファルマケア株式会社
電話 0879-25-7771
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)



発売元
テイクファルマケア株式会社
香川県東かがわ市三本松567番地
製造販売元
金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地

副作用被害救済制度
☎ 0120(149)931



HapYcom

ハピコム

眼精疲労・腰痛・肉体疲労時

肩

ケンラク

第3類医薬品 内服液

50mL

ガラス:ビン、金属:キャップ