



【使用上の注意】

【相談すること】

しばらく服用しても症状が
よくなる場合は服用を
中止し、この製品を持って
医師、薬剤師又は登録販売
者に相談すること

【効能・効果】

●滋養強壮●虚弱体質●
肉体疲労・病中病後・食欲
不振・栄養障害・発熱性消
耗性疾患・産前産後など
の場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1日1回
1本(30mL)を服用する。
・用法及び用量を厳守す
ること。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

ガラス:ビン、金属:キャップ

使用期限

Lot No.

**滋養強壮
虚弱体質**

Yakuho D
内服液

第2類医薬品

薬鳳D

**ゴウチンキ
ニンジンエキス 配合**

Rinyo

製造販売元
金陽製薬株式会社
奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

販売名:薬鳳D

【成分・分量】1日量(1本:30mL)中
ニンジンエキス55mg(日局ニンジン
610.5mgに相当)、ゴウチンキ
0.2mL(日局ゴウチン2mgに相当)、
ロクジョウチンキ0.1mL(ロクジョウ
30mgに相当)、シベットチンキ
0.03mL(シベット3mgに相当)、日
局タウリン300mg、日局チアミン塩
化物塩酸塩10mg、日局リボフラビン
2mg、日局ピリドキシン塩酸塩
6mg、日局ニコチン酸アミド
20mg、日局無水カフェイン50mg
(アルコール含有0.2mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ
酸、白熱、ブドウ糖果糖液糖、D-ソル
ビトール、カラメル、安息香酸Na、パ
ラベン、アルコール、香料、グリセリ
ン、プロピレングリコール、パニリン、
エチルパニリンを含有します。

- 本剤に配合されているリボフラビ
ンにより、尿が黄色になることがあ
ります。
- 生薬成分を含むため、まれに沈澱
を生じることがありますが、薬効に
は支障ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所
に保管すること。(2) 小児の手の届
かない所に保管すること。(3) 他の
容器に入れ替えないこと(誤用の原
因になったり品質が変わる。)。 (4)
使用期限の過ぎた製品は服用し
ないこと。

30mL ¥400+税