



第2類医薬品

# 婦人薬「実母散顆粒」

婦 人 薬

## 特 徴

- クミアイ 婦人薬「実母散顆粒」は、婦人薬として名高い、漢方処方「当帰芍薬散」にもとづいた生薬製剤です。
- 女性特有の不快な症状に効果のある9種の生薬がおだやかに作用し、もつれた糸をときほぐすように不快な症状を解消していきます。
- 血行を良くし、体を暖めることにより、更年期障害の冷えをはじめ、頭痛、腰痛、肩こりなどにも効果をあらわします。



## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状       |
|-------|-----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 悪心、食欲不振   |

- (2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

## 効能・効果

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え症およびそれらに随伴する次の諸症状：  
月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

## 用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

| 年 齢       | 1回量     | 1日の服用回数 |
|-----------|---------|---------|
| 成人（15歳以上） | 1 包     | 2 回     |
| 15歳未満     | 服用しないこと |         |

# 成分・分量

1日量(2包)中

| 成 分                                                                                      | 含 量   | は た ら き                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| トウキ末    | 300mg | セリ科の「当帰」の根。漢方では温性強壯薬と称し、各種の婦人病に用いられます。血液の循環をよくし、各臓器の作用を高めます。      |
| センキュウ末  | 300mg | セリ科の「川芎」の根。強壯、補血、鎮静作用などがあり、冷え症、月経不順、めまい、頭痛などに用いられます。              |
| シャクヤク末  | 400mg | ボタン科の「芍薬」の根。筋肉のけいれんや緊張をほぐす作用があり、頭痛などに用いられます。                      |
| ボタンビ末   | 200mg | ボタン科の「牡丹」の根の皮。頭痛・腰痛などに有効ですが、血の道症にも多く用いられます。                       |
| ブクリョウ末  | 200mg | サルノコシカケ科の「マツホド」の外皮を削ったもの。利尿作用と鎮静作用を合わせもっています。                     |
| ソウジュツ末  | 200mg | キク科の「ホンバオケラ」の根。ブクリョウ末同様利尿作用があります。                                 |
| ニンジン末   | 300mg | ウコギ科の「オタネニンジン」の根。強壯薬の代表ですが、内分泌を促進したり精神を安定させる作用もあり、更年期障害の緩和に役立ちます。 |
| 紅花末     | 100mg | キク科の「コウカ」の花。浄血、通経薬として産前産後や血の道症、冷え症などに用いられます。                      |
| ケイヒ末    | 100mg | クスノキ科の「桂」の枝の皮。中枢神経系の興奮を鎮静し、また血行を良くする作用もあります。                      |

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

## お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口

電話：0238-46-2013

[月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

販 売 者 **全国農業協同組合連合会**

製造販売者 **協同薬品工業株式会社**

山形県東置賜郡川西町大字西大塚930